

Early Medical Abortion at Home (EMAH)

Information for patients (گھر پر ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق جلد استقاط حمل کرنا، مریضوں کیلئے معلومات)



گھر پر استقاط حمل کیلئے دی جانے والی ہدایات:

یہ طریقہ استعمال کرنے سے قبل درج ذیل اشیاء خریدنی ہوں گی:

• Paracetamol (پیراٹامول)

• Ibuprofen (آئبوپروفین) (اگر آپ کو دمے کا مرض نہیں ہے)

• سفر کے دوران متنی ہونے کی صورت میں لی جانے والی ٹیبلیٹس (گولیاں) (اگر آپ کو کلیٹک کی طرف سے یہ ٹیبلیٹس نہ ملی ہوں)

• سنٹیری ٹاؤلز (ایام حیض میں استعمال کئے جانے والے پیڈز)

• گرم پانی کی بوتل

پہلادان (Mifepristone) مٹھے پر سٹون۔ ایک ٹیبلیٹ

• مٹھے پر سٹون لینے سے ایک گھنٹہ قبل متلی روکنے والی ایک ٹیبلیٹ لیں

• مٹھے پر سٹون صرف ایک ٹیبلیٹ لیں

دوسرا دن (Misoprostol) مزوپروستول

• یہ ضروری ہے کہ اس عمل کے دوران گھر پر ایک بالغ فرد آپ کی مدد کیلئے موجود ہو

• یہ ضروری ہے کہ آپ معمول کے مطابق کھاتے پیتے رہیں اگر آپ ایسا کر سکیں۔ ناشتہ کرنے کی کوشش کریں

• درمیان میں: باقاعدگی سے پیراٹامول لیں (ہر چار سے چھ گھنٹے) اور آئبوپروفین (ہر چار سے چھ گھنٹے)، آپ مزوپروستول ٹیبلیٹ لینے سے کم از کم ایک گھنٹہ قبل پہلی خوراک لیں

• اگر ضرورت ہو تو درمیان میں پیراٹامول اور آئبوپروفین کے ساتھ آپ ڈی ہائیڈرو کوڈین (30 ملی گرام کی ایک ٹیبلیٹ) (ہر چار گھنٹوں کے بعد) لے سکتی ہیں

• متلی روکنے والی دوا: مزوپروستول ٹیبلیٹ لینے سے ایک گھنٹہ قبل آپ متلی روکنے والی ایک ٹیبلیٹ لیں

• Misoprostol۔ مزوپروستول کی چار ٹیبلیٹس اپنی زبان کے نیچے رکھیں یا اپنے وچانٹا (فرج) کے اندر اوپر تک ڈالیں

• اگر چار گھنٹوں کے بعد کوئی بلیڈنگ (خون بہنا) نہ ہو تو مزید دو مزوپروستول ٹیبلیٹس اپنی زبان کے نیچے رکھیں

• اگر آپ کا حمل 6+11-10 ہفتے (دسواں ہفتہ اور آپ کے حمل کے گیارہویں ہفتے کا آخر) کا ہو تو آپ کو مزوپروستول کی تیسری خوراک دی جائے گی (دو مزید ٹیبلیٹس)

آپ دوسری خوراک لینے کے تین چار گھنٹوں بعد مزید دو مزوپروستول ٹیبلیٹس لیں اگر آپ کو ابھی تک کوئی بلیڈنگ نہیں ہوئی۔ یہ دو ٹیبلیٹس آپ پہلے کی طرح اپنی زبان کے نیچے رکھیں

• اگر آپ کو کسی مشورے کی ضرورت ہو تو آپ چوائسز موبائل کو اس نمبر (07765 395 887) پر فون کر سکتے ہیں، یا سینٹ جونز ہسپتال گائنی وارڈ کو اس نمبر

(01506 524 112) پر فون کر سکتے ہیں، یا رائل انفرمری گائنی وارڈ کو اس نمبر (0131 242 2101) پر فون کر سکتے ہیں

• یاد رکھیں اس ٹریٹمنٹ (علاج) کے بعد مائع حمل کا طریقہ اسی دن یا اگلے دن شروع کر دیں (اگر پہلے ہی نہ شروع کر دیا ہو)۔

آپ گھر پر کیا ہونے کی توقع کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں مشورہ

پہلا حصہ، مٹھے پر سٹون: آپ یہ والی ایک ٹیبلٹ گھر پر یا کلینک میں نگل لیں۔ یہ ٹیبلٹ ٹریڈنگ کو تیز کرنے کیلئے لی جاتی ہے۔ یہ اس ہارمون کو روک دیتی ہے جس کو پروجیسٹرون کہا جاتا ہے اور یہ حمل کو جاری رکھنے کیلئے ضروری ہوتا ہے۔ آپ اپنی روزمرہ کی سرگرمیاں جاری رکھ سکتے ہیں، اگرچہ آپ کو ایک سینٹری پیڈ استعمال کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کے وجائنا سے ہلکی سی بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ اس بات کا امکان بہت کم ہوتا ہے کہ بقایا ٹریڈنگ کرنے سے قبل آپ کا حمل باہر آجائے گا، اسلئے اگر آپ کو کوئی بلیڈنگ ہوتی بھی ہے تو برائے مہربانی آپ پلان کے مطابق مزو پروسٹول لے لیں۔

دوسرا حصہ، مزو پروسٹول: آپ کو گھر پر لینے کیلئے مزو پروسٹول کی ٹیبلٹس کا ایک باکس دیا جائے گا، آپ کو یہ ٹیبلٹس 24-72 گھنٹوں کے بعد لینے ہوں گی۔

• مزو پروسٹول کی چار ٹیبلٹس کو آپ اپنی زبان کے نیچے رکھیں (اپنی زبان کے دونوں طرف دو ٹیبلٹس رکھیں)۔ جیسا کہ ذیل میں دیئے گئے ڈایا گرام میں دکھایا گیا ہے (اس کی وجہ سے فوراً ہی درد اور متلی محسوس ہو سکتی ہے)




سب سے پہلے صاف پانی منہ میں ڈال کر کلی کر لیں۔ اس بات کا یقین کریں کہ آپ ایک آرام دہ جگہ پر سیدھا ہو کر بیٹھیں اور ٹیبلٹس کو اپنی زبان کے نیچے رکھیں (دو ٹیبلٹس زبان کے دونوں طرف رکھیں = چار ٹیبلٹس) برائے مہربانی یہ ضروری ہے کہ ٹیبلٹس مکمل طور پر آپ کی زبان کے نیچے ڈھکی ہوئی ہوں۔

کم از کم 30 منٹ کیلئے انتظار کریں اور زبان کے نیچے رکھی گئی مزو پروسٹول ٹیبلٹس کو اپنا کام کرنے دیں)۔ ہمارا مشورہ ہے کہ آپ بغیر حرکت کئے بیٹھے رہیں اور بات نہ کریں، اس وقت کے دوران اس جگہ سے نہ اٹھیں یا کھڑے نہ ہوں۔ 30 منٹ کے بعد مزو پروسٹول کی بقایا بیجی ہوئی ٹیبلٹس کو نگل لینا چاہئے۔

آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ مزو پروسٹول ٹیبلٹس لینے کی وجہ سے منہ میں چاکی (چونا) سا ذائقہ ہو سکتا ہے۔ مزو پروسٹول ٹیبلٹس لینے کی وجہ سے سر میں درد، دست اور پیٹ میں کھنچاؤ (مروڑ) بھی پیدا ہو سکتا ہے۔

• یا آپ یہ ٹیبلٹس وجائنا میں ڈال سکتے ہیں (ٹیبلٹس کو وجائنا کے اندر کافی اُدھر تک ڈالیں جیسا کہ ذیل میں تصویر میں دکھایا گیا ہے)



*** ضروری بات: اگر آپ کو پہلے ہی بلیڈنگ ہو رہی ہے تو مزو پروسٹول کو وجائنا میں نہ ڈالیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کام نہ کریں۔ اس کے بجائے ٹیبلٹس کو اپنی زبان کے نیچے رکھیں۔

مز پر وسٹول ٹیبلٹس لینے کے ایک گھنٹے بعد آپ کی بلیڈنگ شروع ہو جانی چاہئے۔ یہ بلیڈنگ آپ کو معمول کے پیریڈ میں ہونے والی بلیڈنگ سے زیادہ ہوگی۔

***** ضروری بات:** اگر آپ کو مز پر وسٹول ٹیبلٹس لینے کے بعد چار گھنٹے کے بعد بلیڈنگ شروع نہیں ہوتی تو پھر آپ کو مزید دو ٹیبلٹس لینیں چاہئیں۔ یہ اضافی ٹیبلٹس آپ کو زبان کے نیچے رکھنی چاہئیں۔ اگر آپ کا حمل 6+11-10 ہفتوں کا ہے تو آپ کو دوسری خوراک لینے کے بعد تین سے چار گھنٹوں کے اندر مز پر وسٹول کی تیسری خوراک دی جائے گی اگر آپ کو ابھی تک بلیڈنگ شروع نہیں ہوئی۔ یہ والی دو گولیاں آپ اپنی زبان کے نیچے رکھیں۔

کس قسم کا درد محسوس ہوگا؟

آپ کو پیٹ میں کھنچاؤ جیسا درد محسوس ہوگا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا رحم (بچہ دانی) آپ کے حمل کو خارج کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہر عورت کے درد کی شدت مختلف ہوتی ہے۔ عموماً سب سے زیادہ درد اُس وقت ہوتا ہے جب حمل خارج ہونے والا ہوتا ہے۔ یہ درد کم ہو جاتا ہے جب حمل خارج ہو جاتا ہے۔

آپ کو درد کے شروع ہونے سے قبل پیراسٹامول ایک گرام اور آئبوپروفین چار سو ملی گرام لینیں چاہئے۔ اس قسم کے زیادہ تر کیسز میں یہ درد کو کنٹرول کرنے کیلئے کافی ہوتی ہیں۔ تاہم آپ کو کچھ ڈی ہائیڈرو کوڈین ٹیبلٹس (تیس ملی گرام) بھی گھر لے جانے کیلئے دی گئی ہیں اور اگر ضرورت ہو تو آپ ہر چار گھنٹے کے بعد ڈی ہائیڈرو کوڈین کی ایک ٹیبلٹ لے سکتے ہیں۔

ہو سکتا ہے کہ آپ بیڈ میں یا لیٹ رہنا چاہیں، لیکن زیادہ تر عورتیں چلنے پھرنے، ٹی وی دیکھنے یا کچھ پڑھنے میں آرام دہ محسوس کرتی ہیں۔ یہ آپ کی مرضی ہے جیسا آپ محسوس کریں۔ آپ جتنی بار چاہیں ٹوائیٹ استعمال کر سکتی ہیں اور ٹوائیٹ فلش کر سکتی ہیں۔ آپ کو متلی محسوس ہو سکتی ہے۔ آپ کو قے آسکتی ہے یا دست ہو سکتے ہیں۔

اگر آپ کی ٹریٹمنٹ سے قبل آپ کا الٹراساؤنڈ سکین نہیں ہوا تھا تو ایکٹوپک پریگننسی ((بچہ دانی سے باہر حمل ہونا۔ عموماً یوب میں) نہ ہونے کے بارے میں مکمل طور پر یقین نہیں کیا جاسکتا اور اسلئے اگر آپ کو پیٹ کے نچلے حصے میں ایک جانب درد ہو نا شروع ہو جائے یا چکر آنے لگیں، ٹریٹمنٹ سے قبل ایسا محسوس ہو یا ٹریٹمنٹ مکمل کرنے کے بعد آپ کو ایسا محسوس ہو تو آپ کو مشورہ لینے کیلئے سروسز سے رابطہ کرنا چاہئے۔ اگر آپ کو شدید درد محسوس ہونے لگے تو آپ کو مقامی ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ میں جانا چاہئے۔

مجھے کتنی دیر کیلئے بلیڈنگ ہوگی؟

بلیڈنگ کی مقدار مختلف ہو سکتی ہے اور اس کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ حمل کتنے ہفتوں کا ہے۔ بیشتر عورتیں یہ کہتی ہیں 'میرے معمول کے پیریڈ سے بہت زیادہ اور اس میں کچھ بڑے کلوٹس (خون کے لوتھڑے) بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ نو ہفتے کا حمل ہونے کی صورت میں آپ حمل کے کچھ ٹشوز (ریشے) دیکھ سکتے ہیں۔

بلیڈنگ ہر روز آہستہ آہستہ کم ہو جانی چاہئے۔ ہم مشورہ دیتے ہیں کہ ٹامپونز کا استعمال نہ کیا جائے کیونکہ اس سے انفیکشن ہونے کا کچھ خطرہ ہو سکتا ہے۔ برائے مہربانی سینٹری ٹاولز کا استعمال کریں جب تک بلیڈنگ رُک نہیں جاتی۔

آپ تقریباً دو ہفتے کیلئے بلیڈنگ ہونے کی توقع کر سکتے ہیں اگرچہ یہ ایک ماہ یا اس سے زیادہ عرصے کیلئے جاری رہ سکتی ہے۔ اگر آپ کو مسلسل اور بہت زیادہ بلیڈنگ ہو (آرام کرتے ہوئے ایک گھنٹے کے اندر تین یا اس سے زائد پیڈز خون سے بھر جائیں) تو آپ کلینک سے رابطہ کریں یا فوراً ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی جائیں۔ اگر آپ کو اپنی ٹریٹمنٹ کے چوبیس گھنٹوں کے اندر بلیڈنگ شروع نہیں ہوتی تو کلینک سے رابطہ کریں کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ آپ کو مزید ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کلی طور پر چار دن سے کم مدت کیلئے بلیڈنگ ہوتی ہے تو آپ کو کلینک سے رابطہ کرنا چاہئے کیونکہ یہ بھی اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ ٹریٹمنٹ نے کام نہیں کیا اور آپ ابھی بھی حاملہ ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کو بدبودار ڈسچارج آنے لگے یا بخار یا پیٹ میں درد ہو تو انفیکشن ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے اور آپ کو اپنے جی پی (ڈاکٹر) سے رابطہ کرنا چاہئے۔

مجھے مائع حمل کے طریقوں کا استعمال کب شروع کرنا چاہئے؟

بیشتر عورتیں اس ٹریٹمنٹ کے بعد فوراً ہی حاملہ ہو سکتی ہیں اور اسلئے آپ کو مائع حمل کی پلز، پیچرز، رنگ، انجیکشن یا امپلانٹ کا استعمال اسی دن شروع کر دینا چاہئے جب یہ ٹریٹمنٹ کی جائے۔

ہم آپ کو یہ چیزیں فراہم کر سکتے ہیں لیکن اگر کسی وجہ سے ہم ایسا نہ سکیں تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ آپ کو کہاں سے مل سکتی ہیں۔ ہم آپ کیلئے انتظام بھی کر سکتے ہیں کہ آپ انٹرا یوٹرین طریقہ استعمال کریں (کاپر کوائل یا مریینہ کوائل) جو کہ بعد میں کسی تاریخ پر ایک سپیشلسٹ کلینک میں لگوا یا جاسکتا ہے۔

مجھے کیسے علم ہو کہ ٹریسٹ نے کام کیا ہے؟

اگرچہ یہ ٹریسٹ نہایت موثر ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ یہ کام نہ کر سکے اور آپ ابھی تک حاملہ ہوں (سومریضوں میں سے تقریباً ایک مریض کی حمل کو ختم کرنے کی ٹریسٹ کام نہیں کرتی)۔

وہ علامات جن سے پتہ چلتا ہے کہ ٹریسٹ کام نہیں کر سکی اور آپ ابھی بھی حاملہ ہو سکتی ہیں:

• اگر آپ کو مزید وسٹول ٹیسٹس لینے کے بعد چوبیس گھنٹوں کے اندر بلیڈنگ نہیں ہوتی ہے

• اگر آپ کو چار دنوں سے کم مدت کیلئے بلیڈنگ ہوتی ہے

• اگر ایک ہفتے کے آخر میں آپ خود کو ابھی تک حاملہ محسوس کرتی ہیں یا حمل کی علامات موجود ہیں جیسے کہ چھاتیوں میں درد، متلی یا قے، پیٹ کا بڑھنا وغیرہ

• اگر ٹریسٹ کے دو ہفتے بعد حمل سے متعلق پیشاب کا ٹیسٹ (جو ہم نے آپ کو دیا ہے) مثبت ہے یا ناقص ہے

• اگر ٹریسٹ کے بعد ایک ماہ کے عرصے میں آپ کے اگلے پیریڈ نہیں آتے ہیں۔

ایسے حالات ہونے کی صورت میں آپ کو فوراً کلینک سے رابطہ کرنا چاہئے کیونکہ آپ ابھی تک حاملہ ہو سکتی ہیں اور آپ کو مزید ٹریسٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے۔

اس بات کا یقین کرنے کیلئے کہ ٹریسٹ کامیاب ہو گئی ہے ہم یہ بھی چاہیں گے کہ آپ خود گھر میں اپنے پیشاب کا پریگننسی ٹیسٹ کریں۔ ٹریسٹ کے دو ہفتے بعد پیشاب کا پریگننسی ٹیسٹ کرنا چاہئے۔

ہم آپ کو پریگننسی ٹیسٹنگ کٹ دیں گے، یہ پریگننسی ٹیسٹ پیشاب میں حمل کے ہارمون (HCG) کا پتہ لگاتا ہے اور اگر آپ کے پیشاب میں ہارمون کا اوجھا لیول موجود ہوگا تو نتیجہ مثبت ہوگا،

اس سے حمل کے جاری رہنے کا پتہ چل سکتا ہے (ٹریسٹ ناکام رہی)۔

میں یورین پریگننسی ٹیسٹ کیسے کروں؟

پیشاب کا پریگننسی ٹیسٹ کرنا چاہئے، یہ بہتر ہے کہ صبح کے پہلے پیشاب کے نمونے کو ٹیسٹ کیا جائے اور یہ ٹیسٹ ٹریسٹ کے چودہ دن بعد کیا جائے۔ کلینک میں موجود نرس آپ کو یہ سمجھائے گی

کہ یہ ٹیسٹ کیسے کرنا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ ہدایات کے مطابق یہ ٹیسٹ کریں، اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ جاری رہنے والے حمل کا پتہ نہیں چلتا۔ آپ کو اپنے صبح کے

پہلے پیشاب کو ٹیسٹ کرنا چاہئے جب آپ طے شدہ تاریخ پر صبح اٹھتے ہیں۔

خود تشخیصی (سیلف آسمنٹ)

ہم یہ آپ پر چھوڑیں گے کہ آپ خود ہم سے رابطہ کریں اگر پریگننسی ٹیسٹ مثبت ہو، ناقص ہو، یا اگر آپ کو یہ فکر ہو کہ آپ ابھی تک حاملہ ہیں۔ بجز اس کے کہ آپ ہمیں کوئی اور اطلاع دیں ہم

یہی سمجھیں گے کہ ٹریسٹ کامیاب رہی ہے اور اب آپ حاملہ نہیں ہیں۔

مزید وسٹول (دوسرا حصہ) لینے کے چودہ دن بعد آپ کو سیلف آسمنٹ اور یورین پریگننسی ٹیسٹ کرنا چاہئے۔

ٹریسٹ کے بعد مجھے اپنے پیریڈ آنے کی توقع کب کرنی چاہئے؟

بیشتر خواتین جن کو باقاعدگی سے پیریڈ آتے ہوں ان کو ٹریسٹ کے ایک ماہ بعد پیریڈ آنے کی توقع کرنی چاہئے۔ اگر آپ نے کمبائنڈ مانع حمل کی پیل (گولی) کھانی شروع کر دی ہے تو آپ کو پیریڈ

آنے چاہئیں جب آپ ایک ہفتے کیلئے پیل کا ناغہ کرتی ہیں۔ تاہم اگر آپ پروجسٹو جن اونٹلی کا طریقہ شروع کرتی ہیں جیسے کہ پروجسٹو جن اونٹلی پیل، انجیکشن، یا امپلانٹ، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے

اگلے پیریڈ تاخیر سے آسکتے ہیں یا آپ کے پیریڈ بالکل بند ہو جاتے ہیں۔ اگر ٹریسٹ کے ایک ماہ کے بعد آپ کے پیریڈ نہیں آتے یا اگر آپ پروجسٹو جن اونٹلی کا طریقہ استعمال کر رہی ہیں اور آپ

کو فکر ہے کہ آپ ابھی تک حاملہ ہو سکتی ہیں تو برائے مہربانی ہم سے رابطہ کریں (ذیل میں دیکھیں)

وہ خواتین جن کا حمل صرف دس سے بارہ ہفتوں کے درمیان کی مدت کا ہوتا ہے

آپ کو مزید پرسٹول ٹیبلیٹس کی ایک اضافی خوراک دی جائے گی جو ضرورت ہونے پر آپ کو لینی ہوگی اور آپ کے ساتھ ٹیلیفون پر کی جانے والی گفتگو کے دوران اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔

الٹراساؤنڈ سکین

عام طور پر خواتین کو ان کے اسقاط حمل سے قبل الٹراساؤنڈ سکین کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ مجموعی لحاظ سے ایک ایکٹوپک (بچہ دانی سے باہر حمل ہونا۔ عموماً ٹیوب میں) حمل ہونے کا خطرہ نہایت کم ہوتا ہے اور آپ کے ساتھ فون پر بات چیت کے دوران ایکٹوپک سے متعلق علامات یا خطرات کے بارے میں جانچ کی گئی ہوگی۔ اگر آپ کا الٹراساؤنڈ سکین نہیں ہوا اور آپ کو اپنے پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہوتا ہو (ٹریٹمنٹ کے دن کے علاوہ) تو برائے مہربانی چواسرزموبائل کو فون کریں اور ایک نرس سے مشورہ کریں۔ اگر یہ درد شدید قسم کا ہو (جو کہ ایک ایکٹوپک پر یگنسی کی وجہ سے ہو سکتا ہے) تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے مقامی ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ میں جائیں۔

آپ کیلئے خلاصہ:

مفہ پر سٹون کی طے شدہ تاریخ (پہلا دن).....

مزید پرسٹول کی طے شدہ تاریخ (دوسرا دن).....

پریگنسی ٹیسٹ کی طے شدہ تاریخ.....

رابطے کی تفصیلات

اگر آپ فکر مند ہیں کہ آپ ابھی تک حاملہ ہیں یا آپ کو کوئی دیگر تشویشات ہیں تو برائے مہربانی دونوں صورتوں میں ہم سے فوراً رابطہ کریں:

چامرز سنٹر:

سینئر نرس موبائل (سوموار تا جمعہ صبح 8.30 تا 4 بجے شام تک): 07765 395 887

(برائے مہربانی ان اوقات کے بعد رائل انفرمری سے رابطہ کریں)

رائل انفرمری آف ایڈنبرا:

وارڈ 210 رائل انفرمری (گاناکالوجی وارڈ) سوموار تا اتوار کو کسی بھی وقت، فون: 0131 242 2101

سینٹ جوزز ہسپتال:

وارڈ 12 (گاناکالوجی وارڈ) سوموار تا اتوار کو کسی بھی وقت، فون: 01506 524 112

موبائل: 07966 629 971



